

XXXXXXXXXXXXXXXX

PARIS, le xx/xx/xxxx

LE JOUR DU LASER :

- Pas de maquillage.

-DEXAFREE : 1 goutte 4 fois par jour pendant 6 jours. Commencer à 7H30 le matin du laser.

-IOPIDINE 1% 2 unidoses : 1 goutte une heure avant le laser, et une autre juste après le laser= PENSER à APPORTER LA DOSETTE.

- PILOCARPINE 2% (ou ISOPTO-PILOCARPINE 2%) :

\*1 goutte 1H avant le laser

\*1 goutte 20 mn avant le laser

DOLIPRANE 500 : 2 gél ou sachets 1/2H avant le laser

En cas de douleur oculaire ou de rougeur, me téléphoner (portable 06 64 904 924, à utiliser uniquement pour cela ou en cas d'extrême urgence), et prendre :  
DIAMOX : 1 cp matin et soir.

Ordonnance à renouveler 1 fois (pour l'autre oeil)

Pour les collyres, il faut :

- Respecter un intervalle d'au moins 5 minutes entre deux collyres
- Garder les yeux fermés et comprimer l'angle interne de l'œil durant 3 minutes après chaque instillation. **Ceci est encore plus important pour la pilocarpine ++++.**

LIRE LA NOTICE DES MEDICAMENTS

Clinique de la Muette

01 40 72 33 37

46-48 rue Nicolo

75116 PARIS

Niveau -3, se présenter au secrétariat.